



例えば... 手根管症候群

手首中央部が圧迫されると手根管症候群を発症します。進行すると神経麻痺が生じ、物をつまむことができなくなります。安静やステロイド剤の局所注入で効果がなければ、手術で治療する場合がありますので、神経機能を検査できる機器を導入しました。

Neuropack S1



正中、尺骨神経の運動神経検査



NIHON KOHDEN Neuropack Report			
Patient Information		Generated: 2011/01/24	
ID	11	Date of birth	
Name	NCS Sample	In Out	(Unknown)
Sex	Male	Doctor	(Unknown)
Age		Examiner	
Weight		Referring Department	(Unknown)
Height		Examination Date	2002/06/07
History			
Comment			
Motor Nerve Conduction Study			
Median Site	Left	Dur.	Amp.
Wrist	Lat.	5.1ms	15.8mV
Elbow	28.9mVms	8.4ms	15.0mV
Axilla	27.0mVms	12.5ms	0.0uV
Segment	Distance	Interval	NCV
#Wrist	75mm	4.2ms	
Wrist-Elbow	240mm	4.2ms	57.7m/s
Elbow-Axilla		4.2ms	
			ND.
			Temp.
			47 - 63

測定結果はわかりやすいレポートで表示されます。

- ・測定値は正常値との比較が重要です。
- ・手根管症候群になりやすい人
- 中年女性 ● 人工透析をしている人 ● 手を使いすぎる人

